

Хөрөвжсон төл гэжээх аргаас



Хавар шас хайтж ус хомсдох болон бэлгээрийн өвс улам хатгал, шимт чанар нь буран, малын суу шим тагарч төлөө цагахуй болдог. Энэ үед хөрөв төлийг сайн тэжэх хэрэгтэй.

Хөрөв төл өвс, хүчит

багасгамал тэжээлд

буран орсон байх тул

тэдгээрийг эхээс ялан хотонд үзүүлж

тэжээн. Гэлд ногон өвсийг дураар идүүлж

байхын тулд өвсийн сараалжинд хийж

байнга дуургэж бай. Зун ургамал цэцэгтэх

үед хадиж бэлгээсэн вигаминг өвсөөр төл

тэжэхэд хамгийн тохиролжтой. Бог малын

төлл 100-150 гр. бол малын төлл 200-300 гр

хүчтэй, багсарчалт тэжээл оногдохоор болож

нийт төлд өгөх тэжээнийг урьдчилан сайн

тэжээж бэлтгэн Хийгийн чийглэж

пурихтуй болгоод Үд дундын алдал

онгоцонд хийж байранд нь тавина. Эрдэс

тэжээлийг онтол буюу түмпэн саванд хийж,

дүүжэх замаар байнга долоолгож байна.

Цэвэр бүүзэн усаар өдөрт 1-2 удаа тогтол

устах буюу байранд нь үргэлж үстай

байгаж дуртай цагаа ууж байх

боловтолгоор хангана. Хавар өдөр дхлаан

болж бэлчээрэйн цас хансарсан үел хөрөв

төлийг өдрийн цагт 3-4 цаг ойрын бэлчээрт

бэлчээнэ. Ногоонд бүрэн цадгат нь ингэж

тэжээж чадвал төлийг эснэрэлтээс хамгаалж

чадна.

ТЕЛД ТУГЭМЭЛ ТОХИОЛДДОГ ЗАРИМ ӨВЧНИЙ ТУХАЙ



Мал амьтны ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН алба

Төв аймгийн Мал
эмнэлгүйн газар

Мал амьтны ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН алба

Утас: - 7027-2361
Пачийн хаяг: <http://vet.tg.gov.mn/>

Утас: 7027-2361

ТОЛД ТУГЭМЭЛ ТОХИОЛДОГ ЗАРИМ ӨВЧНИЙ ШИНЖ ТЭМДЭГ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГААС



ТӨЛИЙН БУЛЧИХ ЦАЙХ ӨВЧИН:

Булчин цайх нь малын бодис солилцооны хамралын улмаас буличинтгийн эд сөнөөн их биксийн буличин, зурхний хана цагаан цайвар өнгөтгэй болж тэлдээрин үйл ажиллагаад хамрах байдлаар илрээ.

МЭДРЭМТИЙ МАЛ, АМЬТАН:


Энэ өвчнеэр хурга, ишиг, хурга, ишиг, тутал, ботго өвчилне.

ШАЛГААН:

Эх малыг хэвлэгээний дараах үед бие маш болдил еслен /Е витамин/ дутмаг байх үед төл мал энэ өвчинеэр өвчилдэг. Булчин цайх өвчин ихэвчлэн өвөл, харьн улирагд вилх ба хөрөвжсөн төдөл ялангуяа 10-45 хоногийн хөрөвжилтийг хурга, ишэнд тохиолдоно.

Шинж тэмдэг: Чаша алдсан төл хүндээрэл эхээхөө болж, эзтуй, өмхий үнэртэй чадлыг тасралтгүй гаргах, Шинжэн их алдсанас болж нуд ширигж, бие суларч, ходлуу, чих, мөч нь хөрч, шилээ таган унах шинж тэмдэгүүд илрэн.

Оношилох: Хурга ишигийг 80-100 см ондарт өргөөд газартаа эрүүл хурга унхатуудаар хөл дээрээ буух ба харин өвчтэй бол унаад босож чадахтай хэсэг зуур хэвтэнэ.



УРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЦАЙХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

Төлийн булчин цайх өвчнеес урьдчилан сэргийлэхэд бэлзээрэйг зөв ашиглах явдал юм.

ТӨЛИЙН БУЛЧИХ ЦАЙХ ГАРДАГАНД

Төлийн булчин цайх гарсан хээгэй мал отортуулагчийг байх үүдэлтэй малын гардагчийн балансыг шилжүүлж булааны гүурсанд дагнан бэлчээхийг булааны аль нэгийг уулгаж болно.

ХЭРЭВ БЭНЧЭЭР НУТГИЙГ СОЛХ БОЛОМОКТУЙ БОЛ

Сүүрийн хээлтэй хонь ямааг төлөхөөс 20-30 хоногийн өмнө селенлиг натрийн бэлдэллийн малын эмчийн заавраар арьсан дор тарина.



НЯЛХ ТӨЛ ЧАШГА АЛДАХ БҮЮУ БИЖ ӨВЧИН:

Цаг уурын эрс тэрс ножцелтэй малай орны хувьд нялх төл чаша алдах тохиолдог элбэг байлаг.

МЭДРЭМТИЙ МАЛ, АМЬТАН:

Энэ өвчнеэр хурга, ишиг, тутал, ботго өвчилне.

ШАЛГААН:

Нялх төлийг сундууд нь хэт цатгах, дааруулах, муудласан хүйтэн дан суугээр угжих, дээн нь албан эхийн суу хөхүүлэх үед чаша алдана.

ШИНЖ ТЭМДЭГ:

Чаша алдсан төл хүндээрэл эхээхөө болж, эзтуй, өмхий үнэртэй чадлыг тасралтгүй гаргах, Шинжэн их алдсанас болж нуд ширигж, бие суларч, ходлуу, чих, мөч нь хөрч, шилээ таган унах шинж тэмдэгүүд илрэн.

УРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЦАЙХ ХЭМЖЭЭ:

Чаша алдсан төлийт эхэд нь хөхүүхэгчийг сойж, 1-2 удаагийн хөхөх чухаанд сувалтар давстай хар цай, хямтар угжиж

мойл, хад, гөё, сөл, алтан ганнуур, төлөгч өвс, чикэр өвс, ухэр мэхэр, ганга, лицэр зэрэг эмт ургамлын хандны аль нэгийг уулгаж болно.

* Чагаан булааны шуус, өгтөн хар цайг ихээр уулгана.

* Шар булааг хуурн шатаагал үнсийг нь зуурч өгнө.

* Чаша тогтох хүртэл эхийн сүүг бага зэрэг хямчлан угзих хэрэгтэй

* Бик өвчтэй төлийг элгэвч, нэмнээгээр дулаадж, дулаан чийтуүйг байранд байланда.

* Чаша тогтох үеэс бага багаар олон удаа эхэд нь хөхүүлнэ